

Übungen zur Vorlesung Kommutative Algebra  
Übungsblatt 4

Dozent: Prof. Dr. A. Küronya  
Übungen: M. Nickel

02.05.2016

---

**Übung 1** (4 Punkte)

Seien  $X, Y \subset \mathbb{A}^n$  affine Varietäten und  $\Delta = V(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n) \subset \mathbb{A}^{2n}$ . Zeigen Sie:

$$\begin{aligned}\varphi : X \cap Y &\rightarrow (X \times Y) \cap \Delta \\ x &\mapsto (x, x)\end{aligned}$$

ist ein Isomorphismus.

**Übung 2** (4 Punkte)

Sei  $\varphi : R \rightarrow S$  ein Homomorphismus von Ringen,  $X = \text{Spec } R$ ,  $Y = \text{Spec } S$  als topologische Räume. Beweisen Sie:

- (a) Ist  $P \triangleleft S$  ein Primideal, so ist es auch  $\varphi^{-1}(P) \subset R$ . Daher ist

$$\begin{aligned}\varphi^* : Y &\rightarrow X \\ P &\mapsto \varphi^{-1}(P)\end{aligned}$$

eine wohldefinierte Funktion.

- (b) Für  $f \in R$  ist  $(\varphi^*)^{-1}(X_f) = Y_{\varphi(f)}$ , insbesondere ist  $\varphi^*$  stetig bezüglich der Zariski-Topologie (siehe Übung 4).
- (c) Für  $I \triangleleft R$  gilt  $(\varphi^*)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I))$ .
- (d) Ist  $J \triangleleft S$ , so gilt  $\overline{\varphi^*(V(J))} = V(\varphi^{-1}(J))$ .
- (e) Ist  $\varphi$  surjektiv, so ist  $\varphi^*$  ein Homöomorphismus zwischen  $Y$  und  $V(\ker \varphi) \subset X$ .
- (f)  $\text{Spec } R$  und  $\text{Spec}(R/\text{Nil}(R))$  sind homöomorph, wobei  $\text{Nil}(R)$  die Menge der nilpotenten Elemente von  $R$  bezeichne.
- (g) Ist  $\varphi$  injektiv, so ist  $\varphi^*(Y) \subset X$  dicht.
- (h)  $\varphi^*(Y) \subset X$  ist dicht genau dann, wenn  $\ker \varphi \subset \text{Nil}(R)$ .
- (i) Für einen Homomorphismus von Ringen  $\psi : S \rightarrow T$  gilt  $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$ .

**Übung 3** (4 Punkte)

Sei  $X$  ein beliebiger topologischer Raum,  $A, B \subset X$  Teilmengen. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

- (a)  $\text{int}(A) = \{x \in X \mid \text{es existiert } U \subset X \text{ offen mit } x \in U \subset A\}$

- (b)  $\overline{A} = \{x \in X \mid \text{für alle } U \subset X \text{ offen mit } x \in U \text{ gilt } U \cap A \neq \emptyset\}$
- (c)  $A$  ist offen genau dann, wenn  $A = \text{int}(A)$  und  $A$  ist abgeschlossen genau dann, wenn  $\overline{A} = A$ . Zeigen Sie weiterhin:  $X \setminus \text{int}(A) = \overline{X \setminus A}$  und  $X \setminus \overline{A} = \text{int}(X \setminus A)$ .
- (d) Es gilt  $\text{int}(A) \cap \text{int}(B) = \text{int}(A \cap B)$  und  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .
- (e)

$$\bigcap_{\alpha \in I} \text{int}(A_\alpha) \supset \text{int}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \text{int}\left(\bigcap_{\alpha \in I} \text{int}(A_\alpha)\right), \quad \bigcup_{\alpha \in I} \text{int}(A_\alpha) \subset \text{int}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right).$$

- (f) Die Inklusion  $A \subset B$  impliziert  $\text{int}(A) \subset \text{int}(B)$  und  $\overline{A} \subset \overline{B}$ .

**Präsenzaufgaben** Die folgenden Aufgaben sind zur eigenen Übung gedacht und werden nicht abgegeben oder korrigiert.

#### Übung 4

Sei  $R$  ein RIng,  $X := \text{Spec } R$  als topologischer Raum und  $f, g \in R$ . Man definiert

$$X_f := \text{Spec } R \setminus V(f).$$

Zeigen Sie die folgenden Aussagen

- (a) Die Teilmengen  $X_f \subset X$  sind offen in der Zariski-Topologie.
- (b) Die Kollektion  $\{X_f \mid f \in R\}$  ist eine Basis der Zariski-Topologie auf  $\text{Spec } R$  (das heißt, dass jede offene Menge als Vereinigung von Mengen der Form  $X_f$  geschrieben werden kann).
- (c)  $X_f \cap X_g = X_{fg}$ .
- (d)  $X_f = \emptyset$  genau dann, wenn  $f$  nilpotent ist.
- (e)  $X_f = X_g$  genau dann, wenn  $\sqrt{(f)} = \sqrt{(g)}$ .
- (f) Jede offene Überdeckung von  $X_f$  hat eine endliche Teilüberdeckung.

**Zusatzaufgaben** Die folgenden Aufgaben sind zur eigenen Übung gedacht und werden nicht abgegeben oder korrigiert.

#### Übung 5

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

- (a) Eine endliche Vereinigung nirgends dichter Teilmengen ist nirgends dicht.
- (b) Jeder endliche Schnitt dichter Teilmengen ist dicht.
- (c) Sei  $X$  ein irreduzibler noetherscher topologischer Raum,  $U \subset X$  eine nichtleere offene Teilmenge. Ist  $B \subset U$  dicht, so ist  $B \subset X$  dicht.
- (d) Das Bild einer irreduziblen Untervarietät von  $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$  unter einer regulären Abbildung ist irreduzibel.
- (e) Das Bild einer irreduziblen Untervarietät von  $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$  unter einer regulären Abbildung ist eine irreduzible Untervarietät des Zielraums.

### Übung 6

Seien  $X, Y$  affine Varietäten. Wie ist das Verhältnis der Zariski-Topologie auf  $X \times Y$  und der Produkt Topologie?

### Übung 7

Sei  $X$  ein beliebiger topologischer Raum. Zeigen Sie, dass  $X$  genau dann Hausdorffsch ist, wenn  $\Delta(X) \subset X \times X$  eine abgeschlossene Teilmenge ist.

Dieses Blatt kann bis spätestens **12:00 Uhr am Montag, den 09.05.**, im Schließfach ihrer jeweiligen Tutoren im 3. Stock, Robert-Mayer-Str. 6, abgegeben werden. Bitte denken Sie daran, Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer mit anzugeben und alle Blätter, zum Beispiel mit einem Schnellhefter, zusammen zu halten.