

4. Übungsblatt (erschienen am 30.11.2016)

Aufgabe 4.1 (Votieraufgabe)

Der Approximationssatz von Weierstraß besagt, dass der Raum der Polynome auf $[0, 1]$ bezüglich der Supremumsnorm dicht im Raum der stetigen Funktionen $C([0, 1])$ liegt.

Folgern Sie, dass der Raum der Polynome auch bzgl. der H^1 -Norm dicht in $H^1(]0, 1[)$ liegt.

Aufgabe 4.2 (Votieraufgabe)

Beweisen Sie die *Poincaré-Friedrichsche Ungleichung*: sei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ein beschränktes Gebiet mit glattem Rand und sei Ω in einem d -dimensionalen Würfel der Kantenlänge s enthalten. Dann gilt

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq s|v|_{H^1(\Omega)} \quad \text{für alle } v \in H_0^1(\Omega),$$

wobei zu $u \in H^m(\Omega)$ durch $|u|_{H^m(\Omega)}^2 := \sum_{|\alpha|=m} \|D^\alpha u\|_{L^2(\Omega)}^2$ die $H^m(\Omega)$ -Seminorm definiert wird.

Aufgabe 4.3 (Schriftliche Aufgabe)[5 Punkte]

Wir betrachten das homogene Dirichlet-Problem mit $c = 0$ aus Folgerung 2.42: sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet mit glattem Rand, $a \in L_+^\infty(\Omega)$ und $f \in L^2(\Omega)$. Zeigen Sie, dass das homogene Dirichlet-Problem

$$-\nabla \cdot (a \nabla u) = f \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

eindeutig lösbar ist und die Lösung stetig und linear von der rechten Seite f abhängt. Zeigen Sie eine analoge Aussage auch für das inhomogene Dirichlet-Problem.

Aufgabe 4.4 (Programmieraufgabe)[2+4 Punkte]

Wir betrachten das homogene Neumannproblem

$$-\Delta u + u = \chi_{[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]} \quad \text{in }]0, 1[, \quad u'(0) = 0, \quad u'(1) = 0$$

und seine variationelle Formulierung

$$b(u, v) = l(v) \quad \forall v \in H^1(]0, 1[),$$

wobei für $u, v \in H^1(]0, 1[)$

$$b(u, v) := \int_0^1 (u'v' + uv) \, dx \quad \text{und} \quad l(v) := \int_{1/4}^{1/2} v \, dx.$$

Weiterhin bezeichne $\Pi_n := \{u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, u(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n\}$ den Raum aller Polynome mit Höchstgrad n .

(a) Zeigen Sie, dass $u \in \Pi_n$ genau dann

$$b(u, v) = l(v) \quad \forall v \in \Pi_n$$

löst, wenn die Koeffizienten von $u(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} b(1, 1) & b(1, x) & \dots & b(1, x^n) \\ b(x, 1) & b(x, x) & \dots & b(x, x^n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b(x^n, 1) & b(x^n, x) & \dots & b(x^n, x^n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l(1) \\ \vdots \\ l(x^n) \end{pmatrix}$$

lösen.

(b) Berechnen Sie $b(x^n, x^m)$ und $l(x^n)$ für alle $n, m \in \mathbb{N}_0$ und schreiben Sie ein Programm, das die Lösung von

$$b(u, v) = l(v) \quad \forall v \in \Pi_n$$

bestimmt. Plotten Sie u für verschiedene Werte von n .

Hinweise zur Übungsblattbearbeitung:

- Zu **schriftlichen Aufgaben*** soll eine Ausarbeitung/Lösung angefertigt werden, die bis zum 08.12.2016 um 12:00 Uhr in den Kästen ihres Übungsleiters im 3. Stock der Robert-Mayer-Str. 6-8 abzugeben ist. Sollte ein Übungstermin nicht wahrgenommen werden können, so kann die Abgabe der schriftlichen Aufgabe auch bis zum obigen Zeitpunkt an ihren Übungsleiter geschickt werden.
- Zu **Programmieraufgaben*** soll bis zum 08.12.2016 um 12:00 Uhr eine **kommentierte** Ausarbeitung in MATLAB-Code an ihren Übungsleiter geschickt werden. Bitte beginnen Sie die Betreffzeile Ihrer E-Mail mit "**PDGL4_2016_Gruppennummer:**" (wenn Sie z.B. in Gruppe 2 sind, so soll die Betreffzeile mit "PDGL4_2016_2:" beginnen).
- Zu **Votieraufgaben** wird keine schriftliche Abgabe verlangt. Die Lösung wird in der Übung besprochen.
- Alle Aufgaben von Übungsblatt 4 werden in den Übungen zwischen dem 12.12.-15.12.2016 besprochen.

*Die Abgabe und Bearbeitung darf in Zweiergruppen erfolgen.